11. Spp diane

UNIVERSIDADE DO RECIFE

INSTITUTO DE MICOLOGIA

PUBLICAÇÃO N.º 245

KMETIOPSIS - UM NOVO GÊNERO DE FUNGOS TUBERCULARIACEAE.

A. Chaves Batista

G. E. P. Peres

RECIFE — BRASIL

1960

COMMONWEALTH MYCOLOGICAL INSTITUTE
25 JUL 1960

U N I V E R S I D A D E D O R E C I F E

INSTITUTO DE MICOLOGIA

PROF.DR. JOÃO ALFREDO GONÇALVES DA COSTA LIMA
Magnífico Reitor da Universidade

PROF.DR. J.SORIANO DE SOUSA NETO
Vice-Reitor da Univ.

DR. NILDO CARNEIRO LEÃO
Secretário Geral da Univ.

PROF. A. CHAVES BATISTA
Diretor-Pesq.

PESSOAL CIENTIFICO

Dr. Heraldo da Silva Maia - Pesq.
Dr. José Américo de Lima - Pesq.Assist.
Dr. Jarbas Sizenando Silveira - Pesq.Assist.
Dr. José Rego Vieira - Médico Atend.
Drª Semíramis Oliveira - Pesq.Assist.
Dr. Sylvio T.C. Campos - Pesq.Honor.
Dr. Fernando B. Leal - Assist.Pesq.
Dr. Waldir Bandeira da Silva - Histopat.
Drª Ruth Garnier de Sousa - Biot.
Dr. José Ulysses Correia - Zimol.
Reginaldo Pessoa Coelho - Zimol.
Dr. José Oliveira da Silva - Chefe Laborat.
Generosa Emília Pontual Peres - Aux.Pesq.
Maria Dulcinea Cavalcanti Guedes - Tecn.Cult.
José Luis Bezerra - Aj.Micol.
Ac. Mauro Wanderley Siqueira - Aux.Biol.
Dr. Clísthenes T. Vasconcelos - Assist.Micol.

UNIVERSIDADE DO RECIFE

INSTITUTO DE MICOLOGIA

Publicação nº 245

With the Compliments
of Chaves Batista

KMETIOPSIS - UM NOVO GÊNERO DE FUNGOS TUBERCULARIACEAE

A. Chaves Batista

G.E.P.Peres



- 1960 -

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/publicacao-instituto-de-micologia_1960_245

INSTITUTO DE MICOLOGIA-UNIVERSIDADE DO RECIFE

Publicação nº 245

KMETIOPSIS - UM NOVO GÊNERO DE FUNGOS TUBERCULARIACEAE

A.Chaves Batista

G.E.P. Peres

Um novo gênero é, agora, proposto, entre os fungos Tuberculariaceae, por suas discrepantes características de esporodóquios, com fiálides formadoras de fialosporos filiformes, agregados em capítulos apicais. Trata-se de um curioso gênero de fungos, de extrema delicadeza, por sua particular morfologia.

KMETIOPSIS Bat.& Peres n.gen.(Scolecosporae)

Tipo: K.hymenaeae nobis

TUBERCULARIACEAE

Micélio intramatrical. Esporodóquios superficiais, oblongos, pulvinados, sub-hialinos, gelatinosos, diminutos. Fiálides fasciculado-agrupadas, superficiais ou irrompentes, hialinas ou coradas. Fialosporos aciculares contínuos, hialinos, gutulados, agregados em capítulos, acrógenos, gelatinoso-mucosos.

Kmetiopsis Bat.& Peres

K.hymenaeae nobis

Mycelium intramatricale. Sporodochia superficialia, oblonga, pulvinata, gelatinosa, minuta, sub-hyalina. Phialides fasciculato-aggregatae, superficiales vel erumpentes, hyalinae vel coloratae. Phialosporae acicularifor-mes, continuae, guttulatae, in capitulis gelatinoso-mucosis aggregatae, hyalinae.

METIOPSIS HYMENAEAE Bat.& Peres n.sp.

Colônias hipófilas, sub-pulverulentas, i-
oladas, de 1,5-2 mm. de diam. ou confluen-
es, abrangendo quase tôda a superfície do
ospedeiro, Fig. 1. - Micélio superficial au-
ente. Micélio intramatrical pouco abundante,
ub-hialino; hifas de 1,5 u de diam., forman-
o pseudo-estroma imerso, donde irrompem fiá-
ides. Fiálides em fascículos sub-circulares,
liváceas, lageniformes, erectas ou levemente
ecurvadas, de 14-31 u de alt.; ápice de 1,5
de diam. e região mediana de 3-4u de diam.,
ig.2. Fialosporos cilíndricos ou aciculares,
-14 x 0,7-1,5 u, direitos ou recurvados, hia-
inos, contínuos, gutulados, aglomerando-se em
apítulos gelatinoso-mucosos, acrógenos.

Sôbre folhas de Hymenaeae sp., associa-
o a Meliola melanochyla Hansf., Paranectria
ffinis (Grév.)Sacc., Pestalotiopsis coperni-
iae (Speg.)Bat.& Peres n. comb., Lembosia

hymenaeae Bat. & Peres n.sp. e Didymobotryum hymenaearum Bat. & Peres n.sp. - Aldeia - São Lourenço da Mata, Pern., Leg. Osvaldo Soares da Silva, 16/4/1959, Tipo, 17365, IMUR.

Coloniae hypophyllae, 1,5-2 mm. diam., simplices vel confluentes. Mycelium liberum nullum. Mycelium intramatricale sub-hyalinum, ex hyphis 1,5-3 u cr. efformatum, pseudo-stromata producens. Phialides fasciculatae, aggregatae, superficiales vel erumpentes, olivaceae, lageniformes, erectae vel incurvatae, 14-31 u alt., 1,5 u in diam. apicali et 3-4 u in area mediana. Phialosporae cylindricae vel acicullariformes, rectae vel incurvatae, hyalinae, continuae, guttulatae, 7-14 x 0,7-1,5 u, in capitulis acrogenis, gelatinoso-mucosis aggregatae.

In foliis Hymenaea sp., soc. iniens cum Meliola melanochyla Hansf., Paranectria affini (Grév.) Sacc., Pestalotiopsi coperniciae (Speg.) Bat. & Peres n.comb., Lembosia hymeneae Bat. & Peres n.sp. et Didymobotryo hymenaearum Bat. & Peres n.sp. - Aldeia - Sao Lourenço, Pern., Leg. Osvaldo Soares da Silva, 16/4/1959, Typus, 17365, IMUR.

oOo

1



2

Figs. 1 e 2
KMETIOPSIS HYMENAEAE Bat. & Peres n.sp.

A B S T R A C T

A new genus Kmetiopsis Bat. & Peres is proposed as a member of the family Tuberculariaceae having superficial sporodochia with fasciculate fialides and filiform, continuous and hyaline fialospores. The type species is K. hymenaeae Bat.& Peres in Hymenaeae sp.

- oOo -

ZUSAMMENFASSUNG

Eine neue Gattung Kmetiopsis Bat. &Peres
ird vorgeschlagen als ein Mitglied der Fami-
ie Tuberculariaceae, mit oberflaechlichen
porodochia mit buendeligen fialides und fi-
iform, fortgesetzten und hyalin fialospores.
ie Gattungs Art ist K.hymenaeae Bat.& Peres
n Hymenaea sp.

oOo

jsc/. ..

Processo Multilith
I.M.U.R., 11/7/1960

blicado pela Divisão de Documentação Científica do I.M.U.R.